# NPK 20-10-8 +12 $SO_3$

**Výrobce:** HOKR, spol. s r.o., Smilova 485, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, IČO: 00580295

**Číslo ohlášení:** O1698 **Číslo typu:** 5.1

**Chemické a fyzikální vlastnosti:**

| **Vlastnost** | **Hodnota** |
|---|---|
| Dusík celkový jako N v % | 20,0 |
| Amonný dusík jako N v % | 12,2 |
| Dusičnanový dusík jako N v% | 7,8 |
| Fosfor celkový jako $P_2O_5$ v % | 10,0 |
| Fosfor vodorozpustný jako $P_2O_5$ v % | 9,0 |
| Fosfor rozpustný v neutrálním citranu amonném jako $P_2O_5$ v % | 10,0 |
| Draslík vodorozpustný jako $K_2O$ v % | 8,0 |
| Síra vodorozpustná jako $SO_3$ v % | 12,0 |
| Částice od 2 mm do 5 mm v % | min. 95 % |

**Obsah rizikových prvků splňuje limity platné v ČR**

**Rozsah a způsob použití:**
Pro aplikaci na ornou půdu a travní porosty na začátku vegetace, při potřebě nastartovat růstu po vzejití v případě dodání dusíku. Hnojivo obsahující dusičnanový a amonný dusík a je určeno zejména na jarní přihnojování plodin, k jejich regeneraci a udržení potřebné hladiny dusíku během vegetace.

**Doporučené dávkování:**

| **Kultura** | **Dávka kg/ha** |
|---|---|
| Pšenice | 100-150 kg/ha |
| Řepka | 150-350 kg/ha |
| Cibuloviny | 150-200 kg/ha |
| Kukuřice | 200-250 kg/ha |
| Cukrovka | 250-350 kg/ha |
| Brambory | 200-250 kg/ha |

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půdy a rostlin).

**Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:**
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

**Upozornění:**
Volně ložené se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m.
PE obaly se doporučují likvidovat recyklací v příslušných zpracovatelských závodech. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.

**Doba použitelnosti:** 60 měsíců při dodržení podmínek skladování v původních obalech.

Hnojivo se dodává balené nebo volně ložené.

**Hmotnost balení:**

**Číslo šarže:** **Datum výroby:**